

MICROPLAN CYNK

NAWÓZ DOLISTNY

Zawartość w 1 litrze: Cynk(Zn) 140 g, Siarka (S) 70 g

Roślina	Termin stosowania	Microplan Cynk l/ha	Ilość cieczy użytkowej l/ha	Średni koszt jednego zabiegu zł / ha	Ew. dodatek mocznika kg/ha
Zboża	- połowa fazy krzewienia	0,5 - 1	100 - 200	13,67	do 15
Ziemniak	-14 dni po pełnych wschodach	0,5 - 1	100 - 200	13,67	do 6
	-10 -14 dni później	0,5 - 1	100 - 200	13,67	
Kukurydza	- 7-8 liści	1	100 - 200	18,22	do 6
	- 10 dni później	1	100 - 200	18,22	
Warzywa	- od fazy 8 do 10 dobrze rozwiniętych liści	0,5	400 - 500	9,11	do 1
Drzewa owocowe	- od fazy pęknięcia pąków do fazy różowego pąka	1	500 - 800	18,22	do 1%
	3-4 opryski co 10 - 14 dni	1	500 - 800	18,22	do 1%
	- można również wykonać oprysk 6 tygodni po wykształceniu zawiązków	0,5	500 - 800	9,11	
Truskawka	- faza wczesnego rozwoju	0,5	100 - 200	9,11	do 6
Motylkowe Strączkowe	- 6-8 liści	1	100-200	18,22	do 6
	- 10 dni później	1	100-200	18,22	do 6

Źródło:

www.obrol.pl

OBROL Sp.j.

ul. Spółdzielcza 3a

62-020 Swarzędz